ЗАДАЧА УБЕГАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИГР ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ГРОНУОЛЛА - БЕЛЛМАНА

Саматов Бахром Тажиахматович¹, Ахмедов Олимхон Улугбек угли²

Абдуманнопов Мухаммадсодик Мухаммадюсуф угли³

¹НамГУ, профессор кафедры дифференциальных уравнение

²ФерГУ, учитель кафедры математики

³ФерГУ, учитель кафедры математики

Аннотация

В этом работе изучается задача убегания для дифференциальных игр первого порядка, когда управления игроков зависимы при ограничениях Гронуолла - Беллмана. Получены новые достаточные условия разрешимости для задачи убегания.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 29 April 2021

Revised form 15 May 2021

Accepted 10 Jun 2021

Ключевые слова: дифференциальная игра, скорость, ограничение Гронуолла - Беллмана, преследователь, убегающий, стратегия

***

Введение

Обычно предполагается, что ранняя выборка задач с преследованием и уклонением начинается с задачей, поставленной и решенной в 1732 году французским математиком, и гидрографом Пьером Бугером. Более поздняя трактовка истории появляется в книге П. Нахин. Но метод преследования-уклонения от задач начал систематически изучаться американским математиком Руфусом Айзексом в 50-х годах. Концепция «Дифференциальных игр» впервые появилась в нескольких его секретных работах по проекту корпорации RAND (США). Исследования Р. Айзека были опубликованы в виде монографий [13], в которых содержалось множество блестящих примеров дифференциальных игр. Автор рассматривал их как проблемы вариационного исчисления и пытался применить метод Гамильтона-Якоби, теперь известный как метод Исаакса. Но для классических методов предмет оказался сложнее. Идея, которую использовал Р. Айзек, носила исключительно эвристический характер. Тем не менее книга [13] вызвала интерес к новым проблемам. Именно тогда математики и

механики, специалисты и любители начали рассматривать дифференциальные игры.

Дифференциальные игры, в которых управление выбиралось только из класса

Ограниченные функции выражают некоторые конструктивные возможности управляющего устройства. Стремление к большей адекватности математических моделей практическим задачам привело к необходимости изучения дифференциальных игр с интегральными ограничениями на управления игроков. Такие ограничения выражают, например, ограничение контроля энергии, уменьшение других веществ, которые расходуются в процессе. Особенно при изучении математических моделей ограничений технических процессов такого рода это важно в научном и прикладном аспекте.

Современные дифференциальные игры как теория развития математические методы управления процессами, сочетающие в себе динамизм, управляемость, борьбу, осведомленность и оптимальное количество других важных качеств, и представляют собой одну из сложнейших математических моделей

реальных процессов, имеющих большое практическое значение. Основу теории положили математики У. Флеминг [10], А. Фридман [11], О. Хайек [12], Л.С. Понтрягин, Н. Красовский [16-17]. При этом авторы выработали собственный подход к теме. Его дальнейшее развитие было достигнуто многими специалистами [2-8, 9-10, 14-18].

В настоящее время существует более ста монографий по теории. Тем не менее, полностью решенных образцов дифференциальных игр довольно мало. Эта работа посвящена задачам уклонения для линейной дифференциальной игры и вводит несколько основных понятий как ограничения типа Гронуолла для управления игроками.

II. Постановка задачи

Пусть в пространстве $\mathbf{R}^n$ управляемый объект $\mathbf{P}$ (преследователь) преследует другой объект $\mathbf{E}$ (убегающий). Предположим, что x и y - это местоположения преследователя и убегающего соответственно, а x_0, y_0 ($x_0 \neq y_0$) - их исходные местоположения. Движение объектов описывается уравнениями

$$\mathbf{P}: \dot{x} = u, \quad x(0) = x_0, \quad (1)$$

$$\mathbf{E}: \dot{y} = v, \quad y(0) = y_0, \quad (2)$$

где $x, y, u, v \in \mathbf{R}^n$, $n \geq 2$.

В настоящее время понятие ограничения Гронуолла-Беллмана первого типа [1] для управления $u(\cdot)$ вводится в форме

$$|u(t)|^2 \leq \rho^2 + 2 \int_0^t l(s) |u(s)|^2 ds \quad (3)$$

где ρ - неотрицательное число, а $l(s)$ - неотрицательная функция. Первый тип ограничений Гронуолла-Беллмана обобщает геометрические ограничения, когда $l(s) = 0$.

Аналогично, понятие ограничения Гронуолла-Беллмана первого типа для управления $v(\cdot)$ вводится в форме

$$|v(t)|^2 \leq \sigma^2 + 2 \int_0^t l(s) |v(s)|^2 ds \quad (4)$$

где σ - неотрицательное число, а $l(s)$ - неотрицательная функция.

Здесь u - вектор скорости преследователя, и здесь изменение u во времени должно быть измеримой функцией $u(\cdot): [0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}^n$. Обозначим через U_{GB} множество всех измеримых функций $u(\cdot)$, удовлетворяющих ограничению Гронуолла-Беллмана (3) (кратко, GB -ограничение).

Аналогично v - вектор скорости убегающего, а здесь временная изменение v должна быть измеримой функцией $v(\cdot): [0, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}^n$. Обозначим через V_{GB} множество всех измеримых функций $v(\cdot)$, удовлетворяющих GB -ограничению (4).

Определение 1. Для тройки из $(x_0, u(\cdot))$, $u(\cdot) \in U_{GB}$ решение уравнения (1), то есть

$$x(t) = x_0 + \int_0^t u(s) ds$$

называется траекторией преследователя на интервале $t \geq 0$.

Определение 2. Для тройки из $(y_0, v(\cdot))$, $v(\cdot) \in V_{GB}$ решение уравнения (1), то есть

$$y(t) = y_0 + \int_0^t v(s) ds$$

называется траекторией убегающего на интервале $t \geq 0$.

Определение 3. Пара классов допустимых управлений, введенная (U_{GB}, V_{GB}) , определяет дифференциальную игру (1) - (4) с ограничениями типа Гронуолла-Беллмана или, кратко, GB -игру.

Определение 4. Для дифференциальной игры (1) - (2) проблема уклонения называется выполненной, однако преследователь выбирает любую управляющую функцию $\forall u(\cdot) \in GB_P$, если для убегающего существует $\exists v^*(\cdot) \in GB_E$ и выполняется следующее условие для траекторий $x(t), y(t)$ которое находится в соответствии с этими функциями управления:

$$x(t) \neq y(t), (t \geq 0)$$

Для решения проблемы уклонения мы предложим следующую стратегию убегающего:

Определение 5. В дифференциальной игре (1) - (2) стратегию убегающего назовем следующей функцией:

$$V_{GB}(t) = -\sigma e^{\int_0^t k(s) ds} \xi_0 \quad (5)$$

где $\xi_0 = \frac{z_0}{|z_0|}$.

Лемма. Предположим, что отображение $U(t) : [0, \infty) \rightarrow R^n$ - ограниченная неотрицательная и измеримая функция. Более того, $l \geq 0$ и $\rho > 0$ постоянны, и для данного, если выполняется неравенство

$$|U(t)|^2 \leq \rho^2 + 2 \int_0^t l(s) |U(s)|^2 ds, \text{ то всегда}$$

верно соотношение

$$U(t) \leq \rho e^{\int_0^t l(s) ds} \quad (3^*).$$

Теорема. Если выполняется следующие условия для дифференциальной игры в ограничения GB

$$\rho \leq \sigma, k(t) \geq 0 \text{ и } t \geq 0$$

то дифференциальной игры в ограничение GB задача убегания называется решенным.

Доказательство.

$$|V_{GB}(t)|^2 = \sigma^2 e^{2 \int_0^t k(s) ds}$$

заменяем правую часть уравнения функцией, большей, чем она сама:

$$|V_{GB}(t)|^2 \leq \sigma^2 + 2 \int_0^t k(s) \sigma^2 e^{2 \int_0^s k(\tau) d\tau} ds$$

$$|z(t)| = \left| z_0 + \sigma \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} \xi_0 - \int_0^t U(s) ds \right|$$

Используя (5) мы получим следующую неравенство

открываем модуль по отдельно

$$\sigma^2 e^{2 \int_0^t k(s) ds} \xi_0^2 \leq \sigma^2 \left(1 + 2 \int_0^t k(s) e^{2 \int_0^s k(\tau) d\tau} ds \right)$$

$$|z(t)| \geq |z_0| + \left| \sigma \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} \xi_0 - \int_0^t |U(s)| ds \right|$$

σ^2 отлично от нуля мы можем поделит обе стороны неравенство на σ^2 , и зная что $\xi_0^2 = 1$ то имеем:

$\int_0^t |U(s)| ds$ заменим его на функцией которая больше, чем она сама из неравенство (3*):

$$e^{2 \int_0^t k(s) ds} \leq 1 + 2 \int_0^t k(s) e^{2 \int_0^s k(\tau) d\tau} ds \quad (6)$$

$$|z(t)| \geq |z_0| + \sigma \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} ds - \rho \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} ds = |z_0| + (\sigma - \rho) \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} ds > 0$$

(6) если проинтегрировать переменную под дифференциалом в интеграле в правой части неравенства, получим следующее неравенство:

для всех $\sigma > 0$ и $\rho > 0$ удовлетворявший $\sigma - \rho \geq 0$ неравенство

$$e^{2 \int_0^t k(s) ds} \leq 1 + \int_0^t d \left(e^{2 \int_0^s k(\tau) d\tau} \right) = 1 + e^{2 \int_0^t k(\tau) d\tau} \Big|_0^t = 1 + e^{2 \int_0^t k(s) ds} - 1 = e^{2 \int_0^t k(s) ds}$$

$$|z_0| + (\sigma - \rho) \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} ds > 0 \quad (7)$$

$$z = U_{GB}(t, v(t)) - V_{GB}(t), z(0) = z_0$$

неравенство всегда верна. Для любой $t \geq 0$ где, $\rho \leq \sigma$ $k(t) \geq 0$ то в GB дифференциальная игре задача убегания читается разрешимой.

Интегрируем оба части равенство:

$$z(t) = z_0 + \int_0^t U(s) ds - \int_0^t V_{GB}(s) ds = z_0 + \sigma \int_0^t e^{\int_0^s k(\tau) d\tau} ds + \int_0^t U(s) ds$$

Литературы.

- [1] Gronwall T.H. Note on the derivatives with respect to a parameter of the solutions of a system of differential equations. *Ann. Math.*, 1919, 20(2): 293-296.
- [2] Azamov A.A. About the quality problem for the games of simple pursuit with the restriction, *Serdika. Bulgarian math. spisanie*, 12, 1986, - P.38-43.
- [3] Azamov A.A., Samatov B.T. *II-Strategy. An Elementary introduction to the Theory of Differential Games.* - T.: National Univ. of Uzb., 2000. - 32 p.
- [4] Azamov A.A., Samatov B.T. *The II-Strategy: Analogies and Applications, The Fourth International Conference Game Theory and Management, June 28-30, 2010, St. Petersburg, Russia, Collected papers.* - P.33-47.
- [5] Azamov A., Kuchkarov A.Sh. Generalized 'Lion Man' Game of R. Rado, *Contributions to game theory and management. Second International Conference "Game Theory and Management"* - St.Petersburg, Graduate School of Management SPbU. - St.Petersburg, 2009. - Vol.11. - P. 8-20.
- [6] Azamov A.A., Kuchkarov A.Sh., Samatov B.T. *The Relation between Problems of Pursuit, Controllability and Stability in the Large in Linear Systems with Different Types of Constraints, J.Appl.Maths and Mechs.* - Elsevier. - Netherlands, 2007. - Vol. 71. - N 2. - P. 229-233.
- [7] Barton J.C, Elieser C.J. *On pursuit curves, J. Austral. Mat. Soc. B.* - London, 2000. - Vol. 41.- N 3. - P. 358-371.
- [8] Borovko P., Rzymowsk W., Stachura A. *Evasion from many pursuers in the simple case, J. Math. Anal. And Appl.* - 1988. - Vol.135. - N 1. - P. 75-80.
- [9] Chikrii A.A. *Conflict-controlled processes, Boston-London-Dordrecht: Kluwer Academ. Publ.*, 1997, 424 p.
- [10] Fleming W. H. *The convergence problem for differential games, J. Math. Anal. Appl.* - 1961. - N 3. - P. 102-116.
- [11] A. Friedman. *Differential Games, New York: Wiley, 1971, - 350 p.*
- [12] Hajek O. *Pursuit Games: An Introduction to the Theory and Applications of Differential Games of Pursuit and Evasion.* - NY.:Dove. Pub. 2008. - 288 p.
- [13] Isaacs R. *Differential Games, J. Wiley, New York-London-Sydney, 1965, 384 p.*
- [14] Ibragimov G.I. *Collective pursuit with integral constrains on the controls of players, Siberian Advances in Mathematics, 2004, v.14, No.2, - P.13-26.*
- [15] Ibragimov G.I., Azamov A.A., Khakestari M. *Solution of a linear pursuit-evasion game with integral constraints, ANZIAM Journal. Electronic Supplement.* - 2010. - Vol.52. - P. E59-E75.
- [16] Krasovskii A.N., Choi Y.S. *Stochastic Control with the Leaders-Stabilizers.* - Ekaterinburg: IMM Ural Branch of RAS, 2001. - 51 p.
- [17] Krasovskii A.N., Krasovskii N.N. *Control under Lack of Information.* - Berlin etc.: Birkhauser, 1995. - 322, p.
- [18] Samatov B.T., Axmedov O.U., Doliyev O.B. *The strategy of parallel pursuit for differential game of the first order with Gronwall-Bellman constraints.* - Namdu Ilmiy axborotnomasi 4-son, 2020 y. 15-20 b.